

Instrucciones de Aplicación por Cada Envase y Forma de Droga



Tube (Tubo con Varilla Medidora y Enrollador)

1. Golpea el tubo boca abajo unas cuantas veces para asegurarse de que toda la crema esté cerca de la abertura.
2. Retire la tapa y conecta la varilla medidora al tubo.
3. Apriete el tubo para dispensar la crema in la varilla.
Nota: El émbolo de la varilla medidora se extenderá para mostrar la cantidad de crema que se dispensa. Continúe exprimiendo hasta que se muestre la dosis correcta.
4. Separe la varilla medidora del tubo y vuelva a colocar la tapa.
5. Presione el émbolo hacia abajo para empujar la crema de la varilla medidora.
6. Aplique la crema solo en el área de la piel indicada por su médico.
7. Limpie la varilla medidora con agua tibia después de cada uso.
8. Coloque el enrollador del tubo según sea necesario para usar completamente toda la crema en el tubo.

Nota: El tubo no es rellenable



Sleek Topi-Pump

1. Retire la tapa.
2. Presione la parte superior del envase hacia abajo completamente para dispensar $\frac{1}{4}$ ml (mililitro)
Nota: Repita el paso 2 según sea necesario si la dosis prescrita es mayor que $\frac{1}{4}$ ml
3. Aplique la crema solo en el área de la piel indicada por su médico.
4. Reemplace la tapa y guardar en posición vertical
Nota: Los Sleek Topi-pumps no son rellenable



Mega-Pump

1. Retire la tapa.
 2. Presione la parte superior del envase hacia abajo completamente para dispensar $\frac{1}{2}$ ml o 1 ml, de acuerdo con el tipo de envase.
Consejo: Repita el paso 2 según sea necesario si la dosis prescrita es mayor que un pump
 3. Aplique la crema solo en el área de la piel indicada por su médico.
 4. Reemplace la tapa y guardar en posición vertical
- Nota: Los Mega-Pumps no son rellenables



Topi-Click

1. Retire la tapa, colocando el pulgar debajo de la parte extendida en la tapa y empujando hacia arriba.
 2. Golpee el envase en posición vertical a una superficie dura para asentar la crema antes de dispensar.
 3. Gire la base en sentido contrario a las agujas del reloj para dispensar $\frac{1}{4}$ ml por cada clic. Es posible que nada sale la primera vez, continúa haciendo giras hasta que la crema empieza salir.
Nota: Repita paso 3 hasta llegar a la dosis recetada por su médico.
 4. Espera más o menos 30 segundos, dando tiempo que toda la crema salga del envase.
 5. Aplique la crema, frotándola a la superficie aplicante solo en el área de la piel especificada por su médico.
 6. Reemplace la tapa y guardar en posición vertical
- Nota: El Topi-Click no es rellenable



¿Cuánto crema es $\frac{1}{2}$ gm (gramo) o un $\frac{1}{4}$ ml (mililitro)?

$\frac{1}{2}$ gm o ml $\frac{1}{4}$ gm o ml



Por favor refiera a esta imagen de acuerdo con la dosis que su médico indicó en su medicamento. Si tiene preguntas, llámanos al número 888.222.2956

Topi-Click PERL

1. Retire la tapa, colocando el pulgar debajo el parte extendido en la tapa y empujando hacia arriba.
2. Golpee el envase en posición vertical a una superficie dura para asentar la crema antes de dispensar.
3. Conecta la varilla aplicador en el puerto extendido en el centro de la carcasa
4. Gire la base en sentido contrario a las agujas del reloj para dispensar $\frac{1}{4}$ ml por cada clic. Es posible que nada sale la primera vez, continúa haciendo clics hasta que la crema empieza salir.
Nota: Repita paso 3 hasta llegar a la dosis recetada por su médico.
5. Espera más o menos 30 segundos, dando tiempo que toda la crema salga del envase.
6. Inclina el aplicador a un ángulo para retirarlo del puerto extendido.
Nota: Si se queda una pequeña cantidad de crema en la parte superior del puerto extendido, esto es parte de la dosis
7. Inserta el aplicador vaginalmente y empuja el émbolo para depositar la crema en el canal vaginal o como su médico le ha instruido.
8. Lavase el aplicador. Reemplace la tapa y guardar en posición vertical.
Nota: El Topi-Click PERL no es rellenable



Triturate

- Tableta hecha de polvo comprimida, pequeña y redonda.
- Opciones personalizadas son disponibles bajo pedido.
- Se disuelve más rápido que un troche, pero más lento que un RDT.
- No lo trague. Debe disolverse en la boca para que sea efectivo, no beba ni coma nada durante los 5 minutos después de que la tableta disuelve.



Rapid Dissolve Tablet (Tableta de Disolución Rápida)- RDT

- Tableta blanca y redonda, hecha de polvo comprimido.
- Se disuelve inmediatamente cuando tiene contacto con saliva
- Típicamente se disuelve en la boca, debajo la lengua. Para que sea más efectivo, no beba ni coma nada durante los 5 minutos después de tomarla



Troche

- Pastilla cerosa. Forma de dosificación semisólida.
- Opciones personalizadas son disponibles.
- Típicamente se coloca entre la mejilla y la encía o debajo la lengua
- Forma farmacéutica oral de disolución más lenta.
- Requiere refrigeración. (2-8 °C, 36-46 °F) y envío al día siguiente, que aumenta el precio final



NataTroche

- Textura suave, similar al chocolate y creado con ingredientes naturales.
- No requiere refrigeración si es guardado a temperaturas normales.
- Se disuelve más rápido que los otros troches con una textura más agradable.



Vaginal Troche

- Marcado para proporcionar 1/2 o 1/4 de dosis.
- Coloque el troche justo dentro del dispositivo de parto vaginal, insértelo en la vagina y empuje el extremo del dispositivo para insertar el medicamento.
- Requiere refrigeración. (2-8 °C, 36-46 °F) y envío al día siguiente, que aumenta el precio final



Vaginal Suppository (Supositorio Vaginal)

- Coloque el supositorio justo dentro del dispositivo de administración vaginal, insértelo en la vagina y empuje el extremo del dispositivo para insertar el medicamento.
- Requiere refrigeración. (2-8 °C, 36-46 °F) y envío al día siguiente, que aumenta el precio final

